

Jean Chevallier



Grenouille taureau

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)

Cette très grande grenouille verte peut dépasser les 20 centimètres, atteindre près d'1,5 kg, et son chant est tout aussi impressionnant puisqu'il est puissant et ressemble au meuglement d'un bovin, d'où son nom ! Originaires des zones à climat tempéré frais du sud canadien aux zones subtropicales du Mexique, la Grenouille taureau a été introduite, entre autres, en 1968 en Gironde, à Arveyres. Quatre populations viables sont actuellement connues en France : 3 en Aquitaine et une en Sologne. L'espèce a également été détectée en 2002 dans le Loir-et-Cher, où elle occupe quelques étangs (BERRONEAU & OHLER, 2012). Le statut d'espèce invasive qui lui est souvent attribué ne repose que sur peu de fondements encore actuellement. En effet, bien qu'elle soit présente depuis plus de 40 ans en France, ses populations restent encore relativement rares et localisées.

Les observations de Grenouille taureau restent heureusement encore anecdotiques et très ponctuelles en Bourgogne. On recense 3 données, dont 2 relativement récentes. La première est de J.L. DURET et D. HERMANT, le 01-06-1998, qui signalent plusieurs adultes à Til-Châtel (pays des Tille et Vingeanne, 21), dans des plans d'eau de la Chalandruie. Cette donnée n'a semble-t-il jamais été reconfirmée par la suite. Les plus récentes sont nivernaises : Le 24-04-2011, à Mars-sur-Allier (58), H. JOUGNOT et 2 autres personnes entendent un cri atypique dans une mare du bourg. L'animal n'a pas pu être observé. Enfin, le 06-12-2012, lors de la pêche de l'étang de Marvy à Neuvy-sur-Loire (58), les participants ont pu capturer un individu de Grenouille taureau. L'animal a été détruit sur place. La Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre précise avoir déjà observé un tel animal quelques années auparavant (J. GILLAIZEAU, comm. pers. ; cette information récente ne figure par sur la cartographie et dans les analyses chiffrées).

À notre connaissance, il n'existe pas de populations établies en Bourgogne, et la présence ne serait pour l'instant qu'accidentelle, mais une surveillance est désormais nécessaire afin d'endiguer le plus tôt possible d'éventuels phénomènes de colonisation, cette espèce pouvant s'avérer être une menace importante pour l'équilibre de certains écosystèmes bourguignons. Depuis 1997, toute importation dans l'Union européenne de spécimens vivants est prohibée (règlement n°2551 de la CEE, du 15 décembre 1997).




Maud BERTRON

Grenouille taureau.
Saint-Loubes, Gironde, 8 juillet 2010.

Grenouille taureau

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)



Avant 1999

- présence

Après 1999

Nombre de stations géolocalisées

- 30 et plus
- 15 à 29
- 5 à 14
- 3 à 4
- 2
- 1

- présence, stations non géolocalisées

Surface occupée théorique

- > à 5 000 hectares
- 2 500 à 4 999
- 1 500 à 2 499
- 1 000 à 1 499
- 500 à 999
- < à 500

Niveau de connaissance :

BON

(avant 1999 : MOYEN)

		0%	1%	2%	4%	8%	16%	32%	64%	100%
données	avant 1999	1								
	après 1999	1								
stations	avant 1999	1								
	après 1999	1								
communes	avant 1999	1								
	après 1999	1								
maillles	avant 1999	1								
	après 1999	1								
observateurs	avant 1999	2								
	après 1999	1								
rareté	temporelle	RRR								
	spatiale	RRR								